

Fajtára keresni a CTRL majd az F gomb egyidejű lenyomásával megjelenő kis ablakban tud!

ROZS

Bonfire

A BONFIRE zöldrózs ideálisan hasznosítható tömegtakarmányként a tejtermelő tehenészetekben, illetve biogáz előállítására is. A fajta nagyon gyors növekedési eréllyel bír az őszi és a tavaszi vegetációs időszakban is. Összehasonlítva más fajtákkal a legkorábban lehet betakarítani - így fővetésben lehet utána tavaszi áru vagy takarmánynövényeket illeszteni a vetésciklusba – ami nagy előnnyel bír a többi rozsfajtaéhoz képest. Nagy - 20-30 t/ha - fonnyasztott hozamra képes, magas fehérje, cukor és energiatartalom jellemzi, könnyen emészthető strukturális rosttartalom mellett.

gyors talajtakarás ősszel, ezzel óvják a talajt az erózió és defláció káros hatásaitól

jól hasznosul a téli nedvesség

nincs gyomosító hatása

fővetésben tavaszi áru- és takarmánynövények egyaránt vethetőek utána

termesztésük jól gépesíthető, nem igényel pótlólagos beruházást, mivel a szükséges gépek és berendezések rendelkezésre állnak

Termőhely: Nem támaszt különleges követelményeket, minden talajtípuson eredményesen termeszthető.

Vetési idő: Szeptember elejétől október végéig. Szeptemberi vetéstől magasabb hozamok várhatóak az intenzívebb bokrosodás miatt.

Vetés mélység: 2-3 cm

Vetőmag mennyisége: Szeptemberi vetésnél 100 kg/ha, későbbi vetésnél emelni kell a vetőmagnormát.

Tápanyag igény: P2O5: 80 kg/ha, K2O: 200kg/ha, N:100 kg/ha

Betakarítás ideje: Az első kalászok megjelenése után (április közepétől)

Betakarítás: állati takarmányozásra: praktikusabb 2 menetben, fonnyasztással

Biogáz felhasználásra: lehet 1 menetben is, fonnyasztás nélkül

Hozam: Rövid, 45-60 napos tavaszi vegetációs idő jellemzi. A napi szárazanyaghozam kb. 85 kg/ha, 15-25 t/ha várható zöldhozam.

Dankowskie Diament

martonvásári fajta

Jó bokrosodó és állóképességű, közepes magasságú rozsfajta, melynek szemtermése fehérjében gazdag. Nemcsak szemtermést adó, hanem zöldtakarmányt célzó termesztése is gazdaságos, akár extenzív feltételek között is.

Életforma őszi

Típus fajtarozs

Éréscsoport középkorai

Üzemi termőképesség [t/ha] 4,0-5,5

Sütőipari érték szerinti csoport: Malmi/zöldtakarmány

Jó betegség tolerancia

Magas stressztűrőképesség

Termőképesség [t/ha]: 4,0-5,5

Átlagos kalászolási idő vetéstől [nap]: 130

Átlagos érésidő vetéstől [nap]: 210

Télállóság: jó

Állóképesség betakarítás előtt jó

Növénymagasság [cm]: 145-165

Bokrosodóképesség: jó

Jellemző ezermagtömeg [gramm]: 23-30

Ajánlott csíraszám (szem./tak.) [csíra/m²]: 400-450/450-500

Optimális vetésidő (szem.): IX. 20-X. 5.

Optimális vetésidő (tak.): IX. 15-30.

Hektolitertömeg [kg/100 l] 72-78

Esésszám (Hagberg) [mp] 200-300

Nyersfehérje-tartalom [%] 9,0-13,0

Kisvárdai legelő

Debreceni egyetem

Botanikai jellemzése:

Gyors kezdeti fejlődésű, erőteljes, nagy zöldtömeget adó fajta.

Bokrosodó és gyomelnyomó képessége kiváló.

Magassága 140-160 cm, szára vastag, levele széles.

Megdőlésre kissé hajlamos.

Kalásza hosszú, teljes hosszában jól termékenyül.

Ezerszemtömege: 32-36 g.

Gazdasági értéke:

Rendkívül jó alkalmazkodó képességű, kettős hasznosítású rozsfajta.

Augusztus elején vetve ősszel, illetve tavasszal legeltethető.

Ugyanazon évben megfelelő tápanyag-utánpótlással elfogadható szemtermést is ad.

Termőképessége: 25-30 t/ha zöldtömeg, vagy 3,5-5,5 t/ha szemtermés.

Botanikai jellemzői:

Gyors kezdeti fejlődésű, erőteljes, nagy vegetatív tömegű fajta.

Bokrosodó- és gyomelnyomó képessége kiváló.

Magassága 140-160 cm, szára vastag, levele széles.

Megdőlésre kissé hajlamos.

Kalásza hosszú, teljes hosszában jól termékenyül.

Ezermagtömege 35-40 g.

Gazdasági értéke:

Rendkívül jó alkalmazkodó képességű, kettős hasznosítású rozsfajta, mellyel a leggyengébb talajok is hasznosíthatóak.

Augusztus elején vetve ősszel illetve kora tavasszal legeltethető, ugyanazon évben megfelelő tápanyag-utánpótlással köze-pes szemtermést is ad.

Termőképessége: 25-30 t/ha zöldtömeg vagy 5,5-6 t/ha szem-termés.

Powergreen

a Bonfire-t nemesítő cég legújabb terméke

állóképessége kiemelkedő

stressztűrőképessége átlag feletti, még rossz minőségű talajokon is kiemelkedő termést nyújt

a legmagasabb nyersfehérje tartalommal rendelkező fajta a piacon

koraisága megegyezik a Bonfire és Borfuro fajtákkal (2-5 nappal korábbi)

alacsony megdőlési hajlam

Vetési norma: 80-122 kg/ha

Protector

Saaten Union

teljesnövény-szenázs vagy biomassza hasznosításra

kimagaslóan gyors vegetatív növekedés

magas zöldtömeg- és szárazanyagtermés

A PROTECTOR a tejlő állományokkal rendelkező gazdaságok alternatív tömegtakarmányaként hasznosítható fajtározsa. Erőteljes növekedési erélye nagy zöldtömeget biztosít már igen korai, április végi betakarítással is.

Élettanilag kedvező összetételű, kiválóan emészthető, minőségi szenázs jellemzi. A kritikus, aszályos időszakok elkerülésével a takarmánybázis biztonságát növeli, betakarítása után – május eleji vetéssel – a terület ismét hasznosításba vonható.

A hivatalos német fajtakísérletekben évek óta a legmagasabb szárazanyagtermést mutató zöldrozs. Az egyik leggyorsabb, legintenzívebb fejlődésű rozs, ezért kiválóan védi a talajt a szél- és vízeróziótól. A PROTECTOR még olyan alacsony hőmérsékleti tartományban is képes növekedni, ahol más rozsfajtáknál már leáll a fejlődés.

A legjobb szilázsmínőség akkor érhető el, ha a betakarításkor a kalászkok „hasban” vannak; a későbbi betakarítás a hozam növekedése mellett minőségromlást eredményezhet.

Növényvédelem: teljesnövény szenázs hasznosítása esetén növényvédelem nem szükséges.

Ryefood

Magyar nemesítésű étkezési és takarmány (abrak és szilázs) rozsfajta.

Állami elismerésének éve: 2005. Növényfajta-oltalom megadásának éve: 2007.

Jellemzése: Diploid, félig felálló növekedési típusú, magas szárú, félig lehajló közepes-hosszú kalászú, közepes-hosszú zöld szemszínű és nagy szemméretű (ezerszem-tömege: 28- 35 g) szabad elvirágzású őszi fajta. Idegentermékenyülő.

Gazdasági értéke: Magas fehérje- tartalmú fajta, amely alkalmas étkezési gabona és takarmánygabona termesztésre egyaránt. Lisztjéből önmagában is jó minőségű rozskenyér süthető. A belőle készült kenyér fogyasztása javasolható a betegségmegelőző, egészséges táplálkozásban.

Gyenge termékenységű- és homoktalajokon a legnagyobb termésre képes fajta. Magas szárú, nagy zöldhozamú, de jó állóképességű.

A kalászolás előtt készített szilázs takarmányértéke kiváló: nyersfehérje tartalom 18-21%, szerves anyag- és rostemészthetőség 72-78%

Korán ad kiváló minőségű tömegtakarmányt (április közepe).

Betakarítása (kaszálás) után, még tavaszi növények vethetőek.

Várható hozam: 3-5 t/ha szemtermés, vagy 30-50 t/ha zöldtermés.

Télállósága, szárazságtűrése, valamint bokrosodó - és gyomelnyomó képessége is kiváló.

Gabonalisztharmatra rezisztens, szárrozsdá iránti fogékonysága a standardokéhoz hasonló.

Kitűnő rezisztencia tulajdonságai és gyomelnyomó képessége lehetővé teszik öko-termesztését is.

Termesztési információk: Termesztése homoktalajokon, erdőtalajokon és lejtős, erodált, sekély termőrétegű talajokon is javasolt. Optimális vetésideje szeptember vége.

Vetendő csíraszám: 4,0-4,5 millió/hektár. (180-190 kg/ha)

Varda

Elismerésének éve: 1975

Korábbi neve: Kisvárdai-1.

Botanikai jellemzése: A szára sötétzöld. 130-150 cm magas, megdőlésre kevésbé hajlamos fajta. Kalászain ablakosság nem jellemző, ezerszemtömege 30-35 g.

Gazdasági értéke: Kezdeti fejlődése erőteljes, gyomelnyomó képessége kiváló. Lisztharmattal és barnarozsdával szembeni ellenállóképessége közepes. Télállósága, szárazságtűrése kiváló. A leggyengébb homoktalajok hasznosítására is alkalmas, alacsony költségráfordítás mellett (low input), extenzív körülmények között is biztosan terem. Az ökológiai gazdálkodásban is jól hasznosítható. Lisztje sütőipari célokra megfelelő minőségű. Termőképessége 2,5-5,0 t/ha.

Utolsó módosítás dátuma: 2024. 07. 16.